La plateforme au service des scientifiques d'Auzeville et d'ailleurs : le développement du Single Cell - RNAseq

Association des Jeunes Scientifiques d'Auzeville
16/06/2016
GENTHON Clémence / KUCHLY Claire

A quoi sert une plateforme technologique ?

Comment travaille-t-on ?

équipe de recherche

Conseils
Devis

outils biologiques

robots

AGTCGGTACGTGTCA
 GTGATGCAGGTGACA
 GTCGGTACGTGTCA

Analyse

outils bio-informatiques

AGTCGGTACGTGTCAAGTGCAGGTGACAG
 TCGGTACGTGTCAAGTGCAGGTGACAGTC
 GGTACGTGTCAAGTGCAGGTGACATGCTC

Que développe t-on comme protocoles ?

Analyse du **génom**e:

- Analyse de génotypage par NGS
- Réalisation de Génome de novo

Analyse du **méthylome** par NGS

Analyse du **régulome** (ChIP-Seq)

Analyse de **Métagénom**e par séquençage de l'ARN 16S (Meta 16S-Seq) ou par séquençage complet

Analyse **génomique sur cellule unique**

Analyse de **transcriptome**

- RNA-Seq ou qRT-PCR

Analyse de **Méta-transcriptome**

Le Single-Cell RNAseq

CONTEXTE

Une équipe s'intéresse au microenvironnement tumoral et travaille sur des cellules A spécialisées dans le recrutement des lymphocytes et présentes dans les tumeurs. Une forte densité de cellules A est associée à un pronostic favorable.

PROBLEME

Faible quantité de cellules A dans les tissus et l'impossibilité de les cultiver in vivo pour du RNAseq « classique » donc passage par le C1

OBJECTIF DE L'ETUDE

Analyser le transcriptome des cellules A par RNA-seq et les comparer à d'autres types cellulaires de la paroi vasculaire (cellules C contrôles) à l'échelle de la cellule unique

DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE SUR LA PLATEFORME

Projet SingleCell

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Librairies

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

- 5 souris
- 6 ganglions/souris
- traitement collagenase/Dnase
- marquage Meca79/CD45/GP38
- tri cellulaire au CHU de Rangueil

Suspension cellulaire =
mélange artificiel 80% de A et 20% de C

+ ajout de 3 spikes RNA

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Librairies

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

Capture d'au maximum 96 cellules uniques

- **44 cellules uniques**
- 29 sites remplis mais non exploitables (débris, cellules doubles, amas...)
- 23 sites vides

Discrimination entre A et C sur la base de la microscopie:

- 28 cellules supposées A(63%)
- 16 cellules supposées C(36%)

Conversion des ARN en cDNA grâce à la chimie SMARTer® de Clontech

Quantité de matériel initiale

→ A ~ 0,3 ng/μl

→ C ~ 0,1 ng/μl

Choix de 12 cellules A et 10 cellules B pour la préparation des librairies + 2 bulks artificiels

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Bibliothèques

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

Préparation des bibliothèques avec le kit Nextera XT d'Illumina basé sur une transposase

Profils BioAnalyzer de quelques bibliothèques :

→ Forte hétérogénéité

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Bibliothèques

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

- Multiplexage des 24 bibliothèques
- Séquençage en 2x100 pb en mode Rapid sur 2 lanes

RESULTATS

- Entre 2 000 000 et 4 000 000 de reads/lane.
- Qualité des reads globalement correcte

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Librairies

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

- Reproductibilité des manipulations Lane1 – Lane2

- Recherche des spikes dans les échantillons – vérification de la proportion

	Lane1		Lane2	
	Bulk-control C	Bulk-Cellules A	Bulk-control C	Bulk-Cellules A
nb reads flowcell	171 911 756	171 911 756	162 668 032	162 668 032
nb reads echantillons	8 564 120	7 310 220	8 076 818	6 868 386
nb align spike 1	1 751 488	264 816	1 631 185	243 442
nb align spike 4	149 690	25 994	137 590	23 977
nb align spike 7	11 940	3 707	10 900	1 539

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Librairies

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

Etude des cellules HEV

Etude des cellules Contrôle

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Bibliothèques

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

Analyses par C. Klopp

- Courbe de raréfaction

→ On n'atteint pas de plateau mais on s'y approche

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Bibliothèques

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

Analyses par C. Klopp

- Corrélations entre échantillons

Exemple de projet

Suspension cellulaire

Processus du C1

- Capture des cellules
- Microscopie
- Lyse
- Retro-transcription
- PCR

Préparation des Librairies

Séquençage Hiseq2500

Analyse des données

Analyses par C. Klopp

- Exemple de ce qui est obtenu habituellement en RNAseq

How deep is enough in single-cell RNA-seq?

Aaron M Streets & Yanyi Huang

Guidelines for determining sequencing depth facilitate transcriptome profiling of single cells in heterogeneous populations.

Conclusion

- Si cellules avec variations d'expression de genes importantes alors ultra low sequencing (<10 000 reads) suffisant
- Cellules neuronales differents stades de developpement : 50 000 reads